

MYZOL



METAMIZOL SODIUM

500 mg/ml

Перорални капки, раствор

ШИШЕ 20 ml

learn



FARMACEUTICI
1928

Производител: ABC Farmaceutici, Italia



1. Што е Muзол и за што се користи

Muзол содржи метамизол натриум. Припаѓа на групата лекови наречени „Аналгетици и антипиретици, пиразолони“.

Muзол е индициран за третман на:

- силна или постојана болка;
- тешка или постојана треска.(температура)

Деца и адолесценти Други лекови и Muзол

За деца на возраст под 5 години, се препорачува администрација под медицински надзор.

Избегнувајте конзумирање алкохол додека земате Muзол бидејќи негативните ефекти од асоцијацијата не можат да се исклучат.

Доење Продуктите од распаѓање на метамизол поминуваат во мајчиното млеко во значителни количини и не може да се исклучи ризикот за доенчето. Затоа мора да се избегнува повторната употреба на метамизол за време на доењето. Во случај на еднократна администрација на метамизол, на мајките им се советува да го собираат и фрлаат мајчиното млеко 48 часа по дозата.

Плодност Престанете да земате Muзол ако имате проблеми со плодноста или сте биле подложени на тестови за плодност.

Воzeње и ракување со машини Кај пациенти кои земаат Muзол, способноста за концентрација и реакција може да биде нарушена, што претставува ризик во ситуации кога овие способности се особено важни (на пример, воzeње возила или ракување со машини). Ова особено се однесува ако сте конзумирале алкохол.

Muзол содржи натриум Овој лек содржи 38 mg натриум (главна компонента на готвење/готварска сол) на доза од 20 капки (што одговара на 500 mg метамизол), што е еквивалентно на 1,9 % од препорачаната максимална дневна доза за возрасен.

2. Како да се земе Muзол Секогаш земајте го овој лек точно како што ви кажал вашиот лекар или фармацевт. Доколку се сомневате, прашајте го вашиот лекар или фармацевт. Земете ги капките разредени во малку течност.

500 mg/mL перорални капки, раствор (1 mL = 20 капки) Дозирањето зависи од интензитетот на болката или треската и чувствителноста на поединецот на одговор на Muзол. Секогаш треба да се избере најниската доза потребна за контрола на болката и треската. Вашиот лекар ќе ви каже како да земате Muзол.

Следната табела ги прикажува препорачаните единечни дози и максималните дневни дози во зависност од тежината или возраста:

ТАБЕЛА НА ДОЗИРАЊЕ

Телесна тежина		Единечна доза		Дневна максимална доза	
kg	Возраст	Капки	mg	Капки	mg
< 9	< 12 Месеци	1 - 5	25 - 125	4 - 20	100 - 500
9 - 15	1 - 3 Години	3 - 10	75 - 250	12 - 40	300 - 1000
16 - 23	4 - 6 Години	5 - 15	125 - 375	20 - 60	500 - 1500
24 - 30	7 - 9 Години	8 - 20	200 - 500	32 - 80	800 - 2000
31 - 45	10 - 12 Години	10 - 30	250 - 750	40 - 120	1000 - 3000
46 - 53	13 - 14 Години	15 - 35	375 - 875	60 - 140	1500 - 3500
> 53	≥ 15 Години	20 - 40	500 - 1000	80 - 160	2000 - 4000

Поединечни дози може да се даваат до четири пати на ден, во зависност од максималната дневна доза. Јасен ефект може да се очекува 30 до 60 минути по орална администрација.

Употреба кај деца и адолесценти За третман на болка, децата и адолесцентите до 14 години може да земаат од 8 до 16 mg Muзол по килограм телесна тежина како индивидуална доза (види табела погоре). Во случај на треска, доза од 10 mg Muзол на килограм телесна тежина е генерално доволна за деца:

Телесна тежина		Единечна доза	
kg	Возраст	Капки	Mg
< 9	< 12 Месеци	1 - 3	25 - 75
9 - 15	1 - 3 Години	4 - 6	100 - 150
16 - 23	4 - 6 Години	6 - 9	150 - 225
24 - 30	7 - 9 Години	10 - 12	250 - 300
31 - 45	10 - 12 Години	13 - 18	325 - 450
46 - 53	13 - 14 Години	18 - 21	450 - 525